Communiqué de presse



Éclosion de coqueluche déclarée 14 août 2023 - Pour publication immédiate

Le bureau des Services de santé du Timiskaming (SST) ont déclaré une hausse de cas de coqueluche dans la partie centrale du district. Le personnel des SST communique avec les personnes qui ont été exposées et les avise.

En raison de l'augmentation de la coqueluche qui circule dans notre district, les SST aimeraient rappeler aux résidents le suivant:

- restez à la maison si vous êtes malade;
- les adultes et les personnes âgées peuvent être des réservoirs de transmission et, à mesure que leurs niveaux de protection diminuent avec le temps, il est important de recevoir une dose de rappel à l'âge adulte;
- les personnes de tous âges sont encouragées à communiquer avec leur bureau des Services de santé pour prendre rendez-vous si elles doivent ou sont en retard pour leur vaccination.

La coqueluche se distingue du rhume, de la bronchite ou du croupe, par la gravité et la durée de la toux. Alors que la coqueluche commence comme un rhume, avec des éternuements, un écoulement nasal, une faible fièvre et une légère toux, la toux s'aggravera en deux semaines. Après deux semaines, des crises de toux se développent et la toux peut se terminer par une coqueluche. La toux peut être si grave que la personne peut s'étouffer ou vomir pendant les crises de toux. Les épisodes de toux peuvent durer des semaines ou des mois. Les enfants plus âgés et les adultes peuvent avoir une toux prolongée sans la « coqueluche » ou les vomissements. « Les germes de la coqueluche se propagent facilement d'une personne à l'autre. Les enfants de moins d'un an sont les plus à risque d'infection grave. L'immunisation offre la meilleure protection contre la coqueluche » a déclaré le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim de Timiskaming.

Il est important de connaître la vaccination contre la coqueluche et l'exposition :

- Le vaccin contre la coqueluche fait partie de la vaccination systématique des nourrissons, des enfants et des adolescents. Le vaccin est administré à l'âge de deux, quatre, six et 18 mois. Une dose de rappel est nécessaire entre quatre et six ans et de nouveau à 14-16 ans. L'immunité diminue avec le temps; par conséquent, une dose de rappel du vaccin est recommandée pour les adultes.
- Vérifiez auprès de votre professionnel de la santé ou des SST pour vous assurer que vous et votre famille êtes à jour avec la vaccination. Les personnes qui reçoivent des vaccins aux SST ou qui déclarent la vaccination aux SST par le biais de services de garde d'enfants ou d'écoles agréés peuvent consulter leur dossier de vaccination en ligne <u>ici</u>.
- Les personnes enceintes ou immunodéprimées devraient faire un suivi auprès de leur professionnel de la santé pour confirmer leurs antécédents de vaccination. La dose de

- rappel du vaccin contre la coqueluche est recommandée pour toutes les femmes enceintes qui en sont à leur troisième trimestre.
- Le lavage des mains est le moyen le plus efficace de prévenir la transmission des infections. De plus, l'utilisation d'un mouchoir et la toux et les éternuements dans votre bras, pas votre main est également efficace pour réduire la propagation de l'infection.
- Si vous développez des symptômes de coqueluche au cours des 21 prochains jours, faites un suivi auprès de votre professionnel de la santé et informez le bureau des Services santé du Timiskaming.

Pour plus d'informations ou si vous avez des commentaires ou des préoccupations, veuillez communiquer avec le bureau des Services de santé du Timiskaming au 705-647-4305 ou sans frais au 1-866-747-4305.

www.timiskaminghu.com

Pour plus d'informations:

-30-

Personne-ressource pour les médias :

Jennifer Cardinal
Gestionnaire de programme – Santé de la famille
705-647-4305, poste 2274
cardinali@timiskaminghu.com